

Handelsbenaming Fleegard Fogger	
Toelatingsnummer 6306B	
Naam, adres en telefoonnummer van de persoon die de toelating verkreeg Bayer SA-NV – Animal Health Division J.E. Mommaertsiaan 14 1381 Diegem (Machelen) Tel.: (02) 535 66 54 – Fax: (02) 537 36 61	
Naam van elke werkzame stof Pyriproxyfen (juvenieelhormonaal analoog) Cyfluthrin (synthetische pyrethroïden)	Gehalte aan elke werkzame stof 0,05% 0,04%
Naam van andere gevaarlijke stoffen (gehalte in gewichtsprocent) Isopranol (15,00%) Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt (39,91%) Propaan/butaan (15:85) (45,00%)	Aard van het preparaat Spuitsbus met automatisch leegloopventiel
	Aard van de werking Insecticide
	Gewicht/Volume van de inhoud van de verpakking 105 g / 150 ml
Symbolen en aanduidingen van gevaar (R-zinnen) F+ Xi N Zeer licht ontvlambaar Irriterend Milieugevaarlijk	Gebruik waarvoor het product toegelaten is Productsoort 18: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als vlooiënbestrijdingsmiddel als 'One Shot' in woonruimten en andere ruimten voor zover een direct contact met eet- en drinkwaren, alsmede grondstoffen voor de bereiding daarvan is uitgesloten en waar tijdens de toepassing geen personen of dieren verblijven.
Gebruiksaanwijzing Een 150 ml fogger kan gebruikt worden voor een ruimte van minstens 30 m ³ (overeenkomend met een oppervlakte van 15 m ² bij een minimum hoogte van 2 m) tot hoogstens 100 m ³ (overeenkomend met een oppervlakte van 50 m ² bij een minimum hoogte van 2 m). Gebruik voor grotere ruimtes meerdere foggers. Verwijder mensen en huisdieren uit de te behandelen ruimte. Sluit ramen en deuren. Plaats de fogger rechtop in het midden van de te behandelen ruimte. De directe ondergrond rondom de spuitbus zal normaal nat worden door het druipen van de spuitnevel. Activeer de automatische vrijstelling door hard te duwen om de verzegeling van de spuitkop te verbreken. Verlaat de ruimte tijdens de behandeling. De spuitbus leegt zich binnen ongeveer 3 minuten. Verblijf niet in de ruimte tijdens de behandeling. De behandelde ruimte goed gesloten houden gedurende 4 uur. De behandelde ruimte goed ventileren gedurende minstens 1 uur vooraleer deze weer in gebruik te nemen. Het herhalen van de behandeling het jaar door wordt aanbevolen. Voor een doeltreffende vlooiënbestrijding is ook een behandeling van alle aanwezige honden en katten in de woning noodzakelijk met een daartoe bestemd product.	
Milieugevaarlijk. Irriterend voor de huid. Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen.	Eerste hulp maatregelen: Inademen: Frisse lucht, rust. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter. Inslikken: Raadpleeg onmiddellijk een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter. Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

<p>Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.</p> <p>Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.</p> <p>Eetwaren, keukengerei, aquarium goed afdekken, aquariumpomp uitschakelen.</p> <p>Recipiënt onder druk: beschermen tegen zonnestrallen en niet blootstellen aan temperatuur boven 50°C. Niet doorboeren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Niet verstuiven naar een vlam of gloeiend voorwerp.</p> <p>Behandelde ruimtes goed ventileren vooraleer ze weer in gebruik te nemen.</p>	<p>Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiters.</p>
<p style="text-align: center;">Opmerkingen voor de arts</p> <p>Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.</p>	
<p style="text-align: center;">Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het <u>Antigifcentrum, 070/245.245</u></p>	