

Aard van het middel

Corrigerend preparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

O.R.-ACE

Poeder voor drank.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen**Per sachet van 6,875 g poeder:**

Werkzame bestanddelen

- Watervrije Glucose 5000 mg
- Natriumchloride 875 mg
- Kaliumchloride 375 mg
- Natriumwaterstofcarbonaat 625 mg

Per ml gereconstitueerd product:

Werkzame bestanddelen

- Watervrij Glucose 20 mg
- Natriumchloride 3,5 mg
- Kaliumchloride 1,5 mg
- Natriumwaterstofcarbonaat 2,5 mg

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund, varken, pluimvee, paard, schaap, geit, hond, kat.

Indicatie(s)

Rund, varken, pluimvee, paard, schaap, geit, hond, kat:

- Elektrolytentekort;
- Dehydratie.

Contra-indicaties

Geen bekend.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Hyperkaliëmia en/of hypernatriëmia kunnen bij nierinsufficiëntie optreden (zie 'Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik')

Hartfalen kan verergeren en vochtophoping kan plaatsvinden bij hartfalen (zie 'Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik')

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Bij nierinsufficiëntie kan hyperkaliëmia en/of hypernatriëmia optreden doordat teveel aan natrium en kalium niet voldoende wordt uitgescheiden. Bij hartfalen kan vochtophoping plaatsvinden in de longen, buikholte en extremiteiten, terwijl het hartfalen kan verergeren. Daarom dient voorzichtigheid te worden betracht bij het voorschrijven van het middel bij dieren met nierinsufficiëntie en/of hartfalen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Het middel kan gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering

Rund, varken, pluimvee, paard, schaap, geit, hond, kat:

Inhoud van een sachet in 250 ml leidingwater oplossen tot een heldere, kleurloze oplossing. Naar behoefte laten drinken.

Toedieningswijze

In alle gevallen oraal via het drinkwater.

Ververs de oplossing dagelijks of indien deze niet meer helder en kleurloos is.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder 'Bijwerkingen'.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttijden

- Rund, varken, pluimvee, paard, schaap, geit:
vlees: nul dagen.
- Rund, schaap, geit:
melk: nul dagen.
- Pluimvee:
eieren: nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Niet van toepassing.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen bekend.

Houdbaarheidstermijn

5 jaar.

Houdbaarheid na reconstitutie: maximaal 1 dag.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst.