


Hoe vaak moet jij jouw HOND ontwormen?



Preventiemaatregelen

- Indien lintwormstukjes worden gezien rond de anus of in de ontlasting moet je je hond ook ontwormen tegen lintworm met praziquantel en starten met een vlooiënbehandeling.
- Het regelmatig laten onderzoeken van de ontlasting van je hond is een goed alternatief voor het 'standaard' ontwormingsadvies.
- Belangrijke hygiënemaatregelen voor mensen en dieren:
 1. Was goed je handen (vooral ook bij kinderen), zeker voordat je iets gaat eten.
 2. Was groente en fruit goed voor consumptie.
 3. Voer geen rauw vlees. Zorg altijd voor vers drinkwater.
 4. Dek zandbakken af als ze niet worden gebruikt.
 5. Ruim ontlasting van je hond direct op in de tuin of tijdens het uitlaten en gooi het in de restafvalbak. Niet op de composthoop! Was hierna je handen.

Aanvullende behandeling

- Behandeling tegen spoelwormen:**
- Pups ontwormen vanaf een leeftijd van 2 weken, waarbij de behandeling iedere 2 weken herhaald wordt tot 2 weken na het spenen, daarna maandelijks tot een half jaar leeftijd.
 - Zogende teven steeds gelijk met de pups ontwormen tot en met het spenen.
 - Er wordt geadviseerd om drachtige teven niet te ontwormen, door het gebrek aan geregistreerde middelen voor deze doelgroep.

- Honden met een verhoogd infectierisico (sport, show, wedstrijd, kennel) 2 x behandelen, namelijk 4 weken voor een evenement en 2-4 weken erna. In kennels maandelijks ontwormen of op basis van ontlastingsonderzoek.
- Werkhonden (therapie, redding, politie) afhankelijk van het keuzediagram maandelijks ontwormen of op basis van ontlastingsonderzoek

Behandeling tegen lintwormen:

- Honden die door reizen of import in gebieden komen waar de vossenlintworm voorkomt, moeten 4 weken na start van de reis behandeld worden en vervolgens maandelijks tot 4 weken na terugkomst. Na import wormonderzoek laten doen.
- Bij honden die rauw vlees/slachtafval of prooidieren eten of jagen wordt geadviseerd elke 6 weken te ontwormen of op basis van elke 2-3 maanden ontlastingsonderzoek.
- Ontwormen als er een vlooiënbesmetting is.
- Ontwormen als een lintworminfectie wordt gevonden.

Behandeling tegen hartworm:

- Honden die leven in gebieden waar de hartworm voorkomt moeten maandelijks preventief worden behandeld tegen de larven tijdens het muggenseizoen.
- Honden die door reizen of import in gebieden komen waar hartworm voorkomt moeten uiterlijk 30 dagen na vertrek worden behandeld en vervolgens maandelijks tot 30 dagen na terugkomst.

Wil je nog meer informatie van onze dierenarts over het ontwormen van jouw hond ga dan naar www.medpets.nl/ontwormen



Uitleg verschillende wormsoorten

Wormen zijn parasieten die op verschillende plaatsen in het lichaam van het dier kunnen leven. Honden en katten kunnen op elke leeftijd besmet raken, zelfs met wormen die een risico kunnen vormen voor de mens. Enkele belangrijke wormsoorten zijn: spoel-, haak- en lintwormen, waarvan de volwassen wormen leven in de dunne darm; hartwormen die leven in de longslagaders, en de Franse hartworm (of longworm), waarvan de volwassen wormen leven in het bloedvat tussen hart en longen. Sommige wormen kunnen een risico voor de gezondheid van de mens vormen.

Spoelwormen

Spoelwormen zijn de meest voorkomende wormen bij honden en katten en vallen onder de groep rondwormen. Ze worden zo genoemd omdat ze in doorsnede rond zijn. Ze worden gevonden in darmen, luchtwegen, onder de huid, op de ogen, in bijholtes van de neus en in de grote vaten van het hart. De meest voorkomende en belangrijke rondworm in Nederland zijn de spoelwormen van de hond (*Toxocara canis*) en de kat (*Toxocara cati*).

Hartworm

Hartworm is de algemene naam voor de parasitaire worm *Dirofilaria immitis* die honden en katten kan besmetten. Deze worm wordt zo genoemd omdat het leeft in de longbloedvaten van het hart. In Nederland komen infecties met deze wormsoort nog niet voor, wel wordt het aangetoond bij dieren die bijvoorbeeld uit Zuid Europa afkomstig zijn of mee zijn geweest op vakantie naar dit gebied.

Lintwormen

Lintwormen hebben een indirecte levenscyclus. Volwassen lintwormen leven in de darmen van de eindgastheer (bijvoorbeeld de hond of kat) en de onvolwassen stadia van de lintwormen (blaaswormen genaamd, vanwege de vorm) leven in andere diersoorten, de tussengastheren (bijvoorbeeld schaap, vloo, konijn of muis). De hond eet de tussengastheer of delen hiervan op, waardoor de blaasworm het maagdarmkanaal van de hond binnenkomt en vervolgens ontwikkelt tot een volwassen lintworm. Bij de eindgastheer geeft een lintworm bijna nooit problemen.

Franse hartworm

Franse hartworm (longworm)

De Franse hartworm is de naam voor de parasitaire worm *Angiostrongylus vasorum* die honden kan besmetten. Deze worm wordt zo genoemd omdat deze leeft dicht bij het hart in de longbloedvaten. Hij wordt ook wel aangeduid met de term longworm omdat een infectie tot ernstige longschade kan leiden. Deze parasiet komt in Nederland voor. Honden besmetten zich vooral via het opeten van slakken. Honden kunnen ook besmet worden door het eten van prooidieren.

Wil je nog meer informatie van onze dierenarts over het ontwormen van jouw hond of kat, ga dan naar www.medpets.nl/ontwormen

