

# Hoe vaak moet jij jouw HOND ontwormen?

## Hond leeft binnenshuis

De hond leeft uitsluitend binnenshuis of heeft zeer beperkte toegang tot buiten, d.w.z. hij heeft geen direct contact met andere honden en heeft geen toegang tot parken of tuinen. De hond krijgt geen rauw vlees te eten en/of eet geen slakken, naaktslakken of prooidieren.

## De hond heeft regelmatig toegang tot buiten

De hond heeft regelmatig toegang tot buiten, kan vaak vrij rondlopen zonder toezicht en heeft direct contact met andere honden. De hond vertoont jachtgedrag en/of vertoont een verhoogde neiging tot het eten van prooien, slachtafval of krijgt rauw vlees te eten.

De hond heeft de neiging om slakken te eten of komt in contact met slakken en/of eet gras.

### Groep A

1-2 x per jaar ontwormen tegen spoelwormen of op basis van ontlastingsonderzoek.

### Groep B

4 x per jaar ontwormen tegen spoelwormen of op basis van ontlastingsonderzoek.

### Groep C

Behandel 4-12 keer per jaar tegen spoelwormen en longwormen of op basis van (de uitslag van) ontlastingsonderzoek

Behandel 4-12 keer per jaar tegen lintwormen

### Groep D

Behandel 4-12 keer per jaar tegen spoelwormen en longwormen of op basis van (de uitslag van) ontlastingsonderzoek

Behandel 12 keer per jaar tegen lintwormen

## Preventiemaatregelen

- Indien lintwormstukjes worden gezien rond de anus of in de ontlasting moet je je hond ook ontwormen tegen lintworm met praziquantel en starten met een vlooiënbehandeling.
- Het regelmatig laten onderzoeken van de ontlasting van je hond is een goed alternatief voor het 'standaard' ontwormingsadvies.
- **Belangrijke hygiënemaatregelen voor mensen en dieren:**
  1. Was goed je handen (vooral ook bij kinderen), zeker voordat je iets gaat eten.
  2. Was groente en fruit goed voor consumptie.
  3. Voer geen rauw vlees. Zorg altijd voor vers drinkwater.
  4. Dek zandbakken af als ze niet worden gebruikt.
  5. Ruim ontlasting van je hond direct op in de tuin of tijdens het uitlaten en gooi het in de restafvalbak. Niet op de composthoop! Was hierna je handen.

## Aanvullende behandeling

### Behandeling tegen spoelwormen:

- Pups ontwormen vanaf een leeftijd van 2 weken, waarbij de behandeling iedere 2 weken herhaald wordt tot 2 weken na het spenen. Als er een aanhoudend verhoogd risico op infectie bestaat (bijvoorbeeld puppy-speelgroepen), maandelijkse behandelingen tot zes maanden oud.
- Ontworm een zogende teef tegelijkertijd wanneer de puppy's ontwormd worden (vanaf 2 weken na de geboorte).
- Het ontwormen van drachtige honden wordt niet geadviseerd.
- Honden met een verhoogd infectierisico (sport, show, wedstrijd, kennel) 2 x behandelen, maximaal 2 weken voor en 2 weken na het evenement. In kennels maandelijks ontwormen of op basis van de uitslag van een maandelijks ontlastingsonderzoek.
- Werkhonden (therapie, redding, politie) afhankelijk van het keuzediagram maandelijks ontwormen of, wanneer de blootstelling aan vossenlintworm laag is, op basis van de uitslag van een maandelijks ontlastingsonderzoek.

### Behandeling tegen longworm/Franse Hartworm

- Hond die de neiging hebben om slakken en/of naaktslakken te eten en gras te eten afhankelijk van het keuzediagram, bijvoorbeeld op basis van de intensiteit van de opname van slakken/naaktslakken en de besmettingsgraad van de omgeving, maandelijks preventief behandelen.

### Behandeling tegen lintwormen:

- Honden die door reizen of import in gebieden komen waar de vossenlintworm voorkomt, moeten 4 weken na start van de reis behandeld worden en vervolgens maandelijks tot 4 weken na terugkomst. Na import meteen ontwormen.
- Bij honden die rauw vlees/slachtafval of prooidieren eten of jagen wordt geadviseerd elke 4 weken te ontwormen of op basis van elke 2-3 maanden ontlastingsonderzoek.
- Ontwormen als er een vlooiënbesmetting is.
- Ontwormen als een lintworminfectie wordt gevonden.

### Behandeling tegen hartworm:

- Honden die leven in gebieden waar de hartworm voorkomt moeten maandelijks preventief worden behandeld tegen de larven tijdens het muggenseizoen. Tot 30 dagen na het einde van het muggenseizoen.

### Reizen en transport

- Honden die door reizen of import in gebieden komen waar hartworm voorkomt moeten uiterlijk 30 dagen na vertrek worden behandeld en vervolgens maandelijks tot 30 dagen na terugkomst.
- Tijdens het muggenseizoen binnen 30 dagen na aankomst behandelen, aansluitend maandelijks tot 30 dagen na thuiskomst
- Import vanuit gebieden waar hartworm voorkomt: Meteen na de import behandelen. Op het moment van invoer testen op hartworm en na 6 maanden hertesten.

Wil je nog meer informatie van onze dierenarts over het ontwormen van jouw hond ga dan naar [www.medpets.nl/ontwormen](http://www.medpets.nl/ontwormen)



## Uitleg verschillende wormsoorten

Wormen zijn parasieten die op verschillende plaatsen in het lichaam van het dier kunnen leven. Honden en katten kunnen op elke leeftijd besmet raken, zelfs met wormen die een risico kunnen vormen voor de mens. Enkele belangrijke wormsoorten zijn: spoel-, haak- en lintwormen, waarvan de volwassen wormen leven in de dunne darm; hartwormen die leven in de longslagaders, en de Franse hartworm (of longworm), waarvan de volwassen wormen leven in het bloedvat tussen hart en longen. Sommige wormen kunnen een risico voor de gezondheid van de mens vormen.

### Spoelwormen

Spoelwormen zijn de meest voorkomende wormen bij honden en katten en vallen onder de groep rondwormen. Ze worden zo genoemd omdat ze in doorsnede rond zijn. Ze worden gevonden in darmen, luchtwegen, onder de huid, op de ogen, in bijholtes van de neus en in de grote vaten van het hart. De meest voorkomende en belangrijke rondworm in Nederland zijn de spoelwormen van de hond (*Toxocara canis*) en de kat (*Toxocara cati*).

### Hartworm

Hartworm is de algemene naam voor de parasitaire worm *Dirofilaria immitis* die honden en katten kan besmetten. Deze worm wordt zo genoemd omdat het leeft in de longbloedvaten van het hart. In Nederland komen infecties met deze wormsoort nog niet voor, wel wordt het aangetoond bij dieren die bijvoorbeeld uit Zuid Europa afkomstig zijn of mee zijn geweest op vakantie naar dit gebied.

### Lintwormen

Lintwormen hebben een indirecte levenscyclus. Volwassen lintwormen leven in de darmen van de eindgastheer (bijvoorbeeld de hond of kat) en de onvolwassen stadia van de lintwormen (blaaswormen genaamd, vanwege de vorm) leven in andere diersoorten, de tussengastheren (bijvoorbeeld schaap, vlo, konijn of muis). De hond eet de tussengastheer of delen hiervan op, waardoor de blaasworm het maagdakanaal van de hond binnenkomt en vervolgens ontwikkelt tot een volwassen lintworm. Bij de eindgastheer geeft een lintworm bijna nooit problemen.

### Franse hartworm

#### Franse hartworm (longworm)

De Franse hartworm is de naam voor de parasitaire worm *Angiostrongylus vasorum* die honden kan besmetten. Deze worm wordt zo genoemd omdat deze leeft dicht bij het hart in de longbloedvaten. Hij wordt ook wel aangeduid met de term longworm omdat een infectie tot ernstige longschade kan leiden. Deze parasiet komt in Nederland voor. Honden besmetten zich vooral via het opeten van slakken. Honden kunnen ook besmet worden door het eten van prooidieren.

### Longworm

Naast de Franse hartworm komt ook nog de echte longworm voor bij honden, namelijk *Oslerus Osleri*. Deze worm maakt knobbels in de grotere luchtwegen van honden en geven klachten als droge hoest, hoesten bij inspanning of temperatuurschommelingen en ook benauwdheid, vermageren en slecht eten bij jonge honden. Honden besmetten zich door het eten van ontlasting van besmette honden.

Wil je nog meer informatie van onze dierenarts over het ontwormen van jouw hond of kat, ga dan naar [www.medpets.nl/ontwormen](http://www.medpets.nl/ontwormen)

