

Hoe vaak moet jij jouw KAT ontwormen?

Binnen katten

Weinig kans op infectie door wormen omdat er geen knaaagdieren worden gegeten.



Groep A

1-2 x per jaar ontwormen op basis van ontlastingsonderzoek of preventief 1-2 x per jaar ontwormen tegen spoelwormen.

Buitenkatten

Hoge kans op infectie door wormen via het eten van knaaagdieren



Groep B

Behandel 4-12 keer per jaar tegen spoelwormen of op basis van de uitslag van ontlastingsonderzoek.

Behandel 4-12 keer per jaar tegen lintwormen.

Preventiemaatregelen

- Indien lintwormstukjes worden gezien rond de anus of in de ontlasting moet je je kat ook ontwormen tegen lintworm met praziquantel en starten met een vlooiënbehandeling.
- Het regelmatig laten onderzoeken van de ontlasting van je kat is een goed alternatief voor het 'standaard' ontwormingsadvies.
- Belangrijke hygiënemaatregelen voor mensen en dieren:
 1. Was goed je handen (vooral ook bij kinderen), zeker voordat je iets gaat eten.
 2. Was groente en fruit goed voor consumptie.
 3. Voer geen rauw vlees. Zorg altijd voor vers drinkwater.
 4. Dek zandbakken af als ze niet worden gebruikt.
 5. Ruim ontlasting van je hond direct op in de tuin of tijdens het uitlaten en gooi het in de restafvalbak. Niet op de composthoop! Was hierna je handen.

Aanvullende behandeling

Behandeling tegen spoelwormen:

- Kittens ontwormen op 3 weken leeftijd, waarbij de behandeling iedere 2 weken wordt herhaald tot 2 weken na het spenen. Als er een aanhoudend verhoogd risico op infectie bestaat (bijvoorbeeld vrij rondlopen buiten), maandelijkse behandelingen tot zes maanden oud.
- Ontworm een zogende poes mee wanneer de kittens ook worden ontwormd (vanaf 3 weken na de geboorte).
- Katten met een verhoogd infectierisico (show, cattery, asiel) 2 x behandelen, namelijk 2 weken voor en 2-4 weken na het evenement. Voor catteries: maandelijks ontwormen of op basis van een maandelijks ontlastingsonderzoek
- Drachtige poezen eenmalig ontwormen met emodepside spot on (Dronspot) 7 dagen voor de verwachte bevalling voorkomen overdracht van Toxocara Cati larven via de melk op de kittens

Behandeling tegen lintwormen:

- Ontwormen als er een vlooiënbesmetting is.
- Ontwormen als een lintworminfectie wordt gevonden.
- Katten die rauw vlees, prooien en/of slachtafval eten of op jacht gaan moeten minstens 4 x per jaar worden ontwormd of op basis van de uitslag van een ontlastingsonderzoek dat elke 4 maanden wordt gedaan.
- In gebieden waar de vossenlintworm voorkomt, kunnen knaagdierenetende katten besmettelijke eitjes uitscheiden die een risico vormen voor de mens. In vergelijking met honden is het risico op uitscheiding van eitjes echter aanzienlijk lager. Om het restrisico tot nul te reduceren, kan een hogere behandelingsfrequentie worden toegepast. Maandelijkse behandelingen (12 keer per jaar) voorkomen de uitscheiding van eitjes.

Behandeling tegen hartworm:

- In gebieden waar longworm voorkomt of katten die buiten komen, slakken eten of jagen preventief elke 2 maanden behandelen.
- Behandeling tegen hartworm:
 - Katten die leven in gebieden waar de hartworm voorkomt moeten maandelijks preventief worden behandeld tegen de larven tijdens het muggenseizoen en tot 30 dagen na het muggenseizoen.
 - Katten die door reizen in gebieden komen waar hartworm voorkomt moeten binnen 30 dagen na aankomst worden behandeld en vervolgens maandelijks tot 30 dagen na terugkomst.
 - Katten die worden geïmporteerd uit gebieden waar hartworm voorkomt moeten meteen na de import worden behandeld. Daarna testen op een bestaande hartworm infectie en hertesten na minimaal 6 maanden.

Wil je nog meer informatie van onze dierenarts over het ontwormen van jouw hond ga dan naar www.medpets.nl/ontwormen



Uitleg verschillende wormsoorten

Wormen zijn parasieten die op verschillende plaatsen in het lichaam van het dier kunnen leven. Honden en katten kunnen op elke leeftijd besmet raken, zelfs met wormen die een risico kunnen vormen voor de mens. Enkele belangrijke wormsoorten zijn: spoel-, haak- en lintwormen, waarvan de volwassen wormen leven in de dunne darm; hartwormen die leven in de longslagaders, en de Franse hartworm (of longworm), waarvan de volwassen wormen leven in het bloedvat tussen hart en longen. Sommige wormen kunnen een risico voor de gezondheid van de mens vormen.

Spoelwormen

Spoelwormen zijn de meest voorkomende wormen bij honden en katten en vallen onder de groep rondwormen. Ze worden zo genoemd omdat ze in doorsnede rond zijn. Ze worden gevonden in darmen, luchtwegen, onder de huid, op de ogen, in bijholtes van de neus en in de grote vaten van het hart. De meest voorkomende en belangrijke rondworm in Nederland zijn de spoelwormen van de hond (*Toxocara canis*) en de kat (*Toxocara cati*).

Hartworm

Hartworm is de algemene naam voor de parasitaire worm *Dirofilaria immitis* die honden en katten kan besmetten. Deze worm wordt zo genoemd omdat het leeft in de longbloedvaten van het hart. In Nederland komen infecties met deze wormsoort nog niet voor, wel wordt het aangetoond bij dieren die bijvoorbeeld uit Zuid Europa afkomstig zijn of mee zijn geweest op vakantie naar dit gebied.

Lintwormen

Lintwormen hebben een indirecte levenscyclus. Volwassen lintwormen leven in de darmen van de eindgastheer (bijvoorbeeld de hond of kat) en de onvolwassen stadia van de lintwormen (blaaswormen genaamd, vanwege de vorm) leven in andere diersoorten, de tussengastheren (bijvoorbeeld schaap, vloo, konijn of muis). De hond eet de tussengastheer of delen hiervan op, waardoor de blaasworm het maagdarmkanaal van de hond binnenkomt en vervolgens ontwikkelt tot een volwassen lintworm. Bij de eindgastheer geeft een lintworm bijna nooit problemen.

Franse hartworm

Franse hartworm (longworm)

De Franse hartworm is de naam voor de parasitaire worm *Angiostrongylus vasorum* die honden kan besmetten. Deze worm wordt zo genoemd omdat deze leeft dicht bij het hart in de longbloedvaten. Hij wordt ook wel aangeduid met de term longworm omdat een infectie tot ernstige longschade kan leiden. Deze parasiet komt in Nederland voor. Honden besmetten zich vooral via het opeten van slakken. Honden kunnen ook besmet worden door het eten van prooidieren.

Longworm

Bij katten komt naast de Franse hartworm ook nog de kattenlongworm *Aelurostrongylus abstrusus* voor. Pas bij zware infecties ontstaan klachten als hoesten, benauwdheid, slecht eten en vermageren. Een kat kan zich met longworm besmetten door het eten van slakken, kikkers, muizen, vogels en reptielen.

Wil je nog meer informatie van onze dierenarts over het ontwormen van jouw hond of kat, ga dan naar www.medpets.nl/ontwormen

